



တွဲဆက်လက်ကမ်း အထူလျှောက်လှမ်း . . .

ကံဖိုလန်

ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာရည်

KENFOLAN Foliar Fertilizer

Ingredients:
Total Nitrogen :..... 11.0 %
Phosphorus as P₂O₅ :..... 8.0 %
Potassium as K₂O :..... 6.0 %
& TRACE ELEMENTS



ရေတွင်
100 %
ပျော်ဝင်သည်

ထုတ်လုပ်သူ

Kenso Corporation (M) Sdn. Bhd.
B-9-3, PJ8 Block B West, No.23 Jalan Barat,
Seksyen 8, 46050 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia

ဖြန့်ချိသူ

GRAND AGRO CARE Co., Ltd.
No.93, Thuya Road, 9th Ward, South Okkalapa Township, Yangon, Myanmar.
Tel: 01-570096, 09 31485868, 09 250 691007

ISO9001:2008 Certified Company

ကံဖိုလန် ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာရည်

KENFOLAN Foliar Fertilizer

အကျိုးကျေးဇူး

- အချိုးမျှတအောင်စီမံထုတ်လုပ်ထားခြင်းကြောင့် အများ/အနည်းလိုအာဟာရဓာတ်များကို သီးနှံပင်များ အလွယ်တကူလျင်မြန်စွာ ရယူနိုင်စေသည်။
- သီးနှံပင်အားလုံးအတွက် ရာသီမရွေး အသုံးပြုနိုင်သည်။
- သီးနှံပင်၏ကြီးထွားမှု၊ ပန်းပွင့်မှုကောင်းစေခြင်းကြောင့် အထွက်နှုန်းနှင့် အရည်အသွေးကောင်းစေရုံသာမက ရာသီဥတုဆိုးဝါးမှုဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည် ရှိစေပါသည်။ သီးနှံပင်ကို ထိခိုက်မှုမရှိစေပါ။ ပုံမှန်အသုံးပြုသည့် ဆေးဖျန်းခေါင်းများကို အသုံးပြု ပက်ဖျန်းနိုင်သည်။
- အရွက်ဖျန်းအဖြစ် နံနက်စောစော (သို့မဟုတ်) ညနေအချိန်တွင် အခင်းကို စိုရွှံ့အောင်ပက်ဖျန်းပေးပါ။
- အပူချိန် (၅) စင်တီဂရိတ်အောက်နှင့် (၄၀) စင်တီဂရိတ်အထက်တွင် သိုလှောင်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ သို့သော် အခြားဆေးများနှင့် ရောစပ်ပါက အလွယ်တကူပြန်လည်ပျော်ဝင်နိုင်သည်။

သတိပြုရန်

ဝိုးသတ်ဆေး၊ မှိုသတ်ဆေး၊ ပေါင်းသတ်ဆေးများနှင့် ရောစပ်သုံးနိုင်ပါသည်။ လိုင်းဆာလ်ဗာ၊ ဘော်ဒိုးဆေးရည်များနှင့် ရောစပ်မသုံးရပါ။
အခြားဆေးများနှင့် ရောစပ်ပြီးပြီးခြင်း အသုံးပြုပါ။

စိုက်ခင်းသီးနှံပင်များ၊ ဥယျာဉ်ခြံသစ်သီးပင်များ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပင်များ၊ ပျိုးခင်းများ၊ မြက်ခင်းများအတွက် အရွက်ဖျန်းသာမက မြေပြင်ဖျန်းအဖြစ် ဘက်စုံအသုံးပြုနိုင်ပြီး အပင်ကျန်းမာကြီးထွားမှုကို အားကောင်းစေခြင်းကြောင့် အထွက်နှုန်းနှင့် အရည်အသွေးကောင်းမွန်စေသည်။

သုံးစွဲရန်အညွှန်း

သီးနှံ	နှုန်းထား		အသုံးပြုရမည့်အခြေအနေနှင့်အကြိမ်
	လီတာ/တစ်ဧက	စီစီ /ဆေးဖျန်းပုံး(၁)ပုံး	
ဟင်းသီးဟင်းရွက်	၁.၅ - ၂.၅	၈၀ - ၁၂၀	ဝိုးသတ်ဆေး၊ မှိုသတ်ဆေးများနှင့် ရောစပ်၍ (၃ - ၅) ကြိမ်အသုံးပြုပါ။
စပျစ်	၀.၈ - ၁.၅	၄၀ - ၈၀	ပန်းမပွင့်မီ (၁) ကြိမ်နှင့် ပန်းပွင့်ပြီးနောက်ပိုင်း ဝိုးသတ်ဆေးဖျန်းတိုင်း ရောသုံးပါ။
သစ်သီးပင်များ (ပန်းသီး၊ သစ်တော့သီး)	၀.၈ - ၁.၅	၂၀ - ၈၀	ပန်းမပွင့်မီ (၁) ကြိမ်နှင့် နောက်ပိုင်း (၂ - ၄) ကြိမ်သုံးပါ။
ရှောက်မျိုးနွယ်ပင်များ	၀.၈ - ၂	-	ပန်းမပွင့်မီ (၁) ကြိမ်နှင့် ပွင့်ဖတ်ကြွေချိန် (၁) ကြိမ်၊ နောက်ပိုင်း (၄) ပါတ်ခြား (၁) ကြိမ်သုံးပါ။
ငှက်ပျော	၁.၅ - ၂	-	အနည်းဆုံး (၅) ကြိမ် သုံးပါ။
ယာသီးနှံများ (ဝါ၊ ဗျပ်၊ သစ်ဆိမ့်၊ မြေပဲ၊ ပဲမျိုးစုံ၊	၀.၈ - ၂	-	ပန်းပွင့်ချိန်မတိုင်မီသုံးပါ။ မြေပြင်ဖျန်းနှင့်အရွက်ဖျန်းသုံးပါ။
ပြောင်း	၂ - ၄	-	အပင်အမြင့် (၅ - ၈) ပေရှိချိန် ၁၄ ရက်ခြား၍ (၄) ကြိမ်
နံစားသီးနှံများ	၂ - ၄	၁၀ - ၂၀	အပင်ပေါက်ပြီးနောက် ပေါင်းသတ်ဆေးဖျန်းရာတွင် ရောသုံးပါ။
ဆေးရွက်ကြီး	၀.၈ - ၂	၁၀ - ၂၀	အပင်ကြီးထွားမှုရပ်ချိန်နောက်ပိုင်း ဝိုးသတ်ဆေး၊ မှိုသတ်ဆေးဖျန်းရာတွင် ရောသုံးပါ။
အလှစိုက်ပင်များ	-	၁၂.၅ - ၂.၅	(၁) ပါတ် (၁) ကြိမ်အမြစ်နှင့် အရွက်များကို ဖျန်းပေးပါ။
ပျိုးခင်းပင်များ	-	ထယ်ကြောင်းတွင် ပက်ဖျန်းပါက (၁၀၀ - ၃၀၀) စီစီ အရွက်ဖျန်း - (၅ - ၂၀) စီစီ	မြေပြင် (သို့) အရွက်များကို (၁) ပါတ် (၁) ကြိမ် ဖျန်းပေးပါ။
မြက်ခင်း	-	၁၀၀ စီစီ / ဆေးဖျန်းပုံးတစ်ပုံး / ၁၀၀ မီတာပတ်လည်	(၁) ပါတ် (၁) ကြိမ် ဖျန်းပေးပါ။