



ကံဘန်

ထိသေနှင့်စားသေပိုးသတ်ဆေး

KENSBAN 400 EC INSECTICIDE

CHLORPYRIFOS 38.7% w/w EC

Active ingredient: 38.7 %
Chlorpyrifos : 61.3 %
Inert material : 100.0 %
Total : 100.0 %



ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အမှတ် (Regn. No.) P 2014 - 2098

မလေးရှား၊ ဩစတြေးလျ၊ ယိုးဒယား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဗီယက်နမ်နှင့် နိုင်ငံများစွာတွင် စိုက်ပျိုးရေးသုံးဆေးများဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် ဆက်စပ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ အောင်မြင်စွာလုပ်ကိုင်ပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း အလားတူ စိုက်ပျိုးရေးသုံးဆေးများ၊ မြေဩဇာများ၊ ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာများ ဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရန် Golden Owls အမှတ်တံဆိပ်ဖြင့် Kenso စိုက်ပျိုးရေးသုံးဆေးများကို မိတ်ဆက်ဖြန့်ချိလိုက်ပါပြီ။

ထုတ်လုပ်သူ

Kenso Corporation (M) Sdn. Bhd.
B-9-3, PJ8 Block B West, No.23 Jalan Barat,
Seksyen 8, 46050 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia

ဖြန့်ချိသူ

GRAND AGRO CARE Co., Ltd.
B-3.562, Third Street, Off Thihathu Road, 11 Ward, South Okkalapa Township,
Yangon, Myanmar. Tel:09 31485868, 43009563, 09 795652258



ကံဘန် ၄၀၀ အီးစီ ထိသေစားသေပိုးသတ်ဆေး

KENSBAN 400 EC INSECTICIDE


- ထိသေစားသေနှင့် အဆိပ်ငွေ့အာနိသင်ရှိ အော်ဂဲနိုဖော့စဖိတ်အုပ်စုဝင် ဘက်စုံကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုနိုင်သော ပိုးသတ်ဆေးဖြစ်သည်။
- ကိုက်ဖြတ်ဝါးစားပိုးများနှင့် မြေတွင်းအောင်းပိုးများကို ထိရောက်စွာနှိမ်နင်းနိုင်ပြီး ဖျက်ပိုးများနောက်တစ်ကြိမ် မလာနိုင်အောင် ဟန့်တားပေးနိုင်သည့် (Repellent Action) ရှိသည်။
- အဆိပ်ငွေ့အာနိသင်ရှိသဖြင့် မြေပိုင်မြေခဲများကြားတွင် ပုန်းခိုနေထိုင်တတ်သောပိုးများနှင့် သီးနှံပင်ထူထပ်သော အခြေအနေများတွင် ထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်။
- ပိုးကျရောက်မှုဆိုးဝါးပါက ပိုင်ရှိသရွက်အုပ်စုဝင်ဆေးများ၊ ပဋိဇီဝဆေးများဖြင့် ရောစပ်ပက်ဖျန်းခြင်းဖြင့် အဆိပ်အာနိသင်ပိုမိုပြင်းထန်စေသည်။



ပင်ဖြတ်ပိုး



လျှပ်းစိမ်း




သီးလုံးဖောက်ပိုး



လှေးပိုး



ပင်စည်ထိုးပိုး



ပျ

သုံးစွဲရန်အညွှန်း

သီးနှံ	ဖျက်ပိုး	နှုန်းထား(စီစီ/ဧက)	ရိတ်သိမ်းရန် စောင့်ဆိုင်းရမည့်ရက်
နှံစားသီးနှံများ (စပါး၊ ဂျုံ၊ ပြောင်း)	ရွက်ထွင်းပိုး၊ ပင်ဖြတ်ပိုး၊ ပင်စည်ထိုးပိုး၊ အနံပိုး	၂၅၀ - ၅၀၀	၁၄
ဝါ	ငမ္ဘောင်တောင်၊ သီးလုံးဖောက်ပိုး၊ သရစ်ပိုး၊ မွှားပင့်ကူနီ	၂၅၀ - ၅၅၀	၁၄
လိမ္မော်၊ ရှောက်၊ သံပရာ	သီးထိုးယင်၊ ရွက်ထွင်းပိုး	၁၂၅ - ၂၅၀	၁၄
အာလူး	မွှားပင့်ကူနီ၊ ပင်ဖြတ်ပိုး	၂၅၀ - ၅၅၀	၁၄ - ၂၁
ပဲပုပ်	ငမ္ဘောင်တောင်၊ သီးလုံးဖောက်ပိုး၊ ပဲကျိုင်း	၁၂၀ - ၂၅၀	၁၄
သရက်	ခေါင်ညွန့်ဖောက်ပိုး၊ ဖြုတ်ညို၊ သရစ်ပိုး	၃၀၀ - ၃၅၀	၂၁
ပြောင်း	ပြောင်းအမြစ်ဖြတ်ပိုး၊ ပင်ဖြတ်ပိုး	၆၀၀	၁၄ - ၂၁
နေကြာ	အမေရိကန်သီးလုံးဖောက်ပိုး	၁၂၀ - ၂၅၀	၁၄
ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ	ပင်ဖြတ်ပိုး၊ ရွက်ထွင်းပိုး၊ သီးထိုးပိုး	၂၀၀ - ၂၅၀	၂၁

စိုက်ခင်းအတွင်းပြန်လည်ဝင်ရောက်နိုင်သောကာလ - (၂၄)နာရီ
ဆေးဖျန်းခြားရက် - (၇ - ၁၀)ရက်
တစ်ရာသီဆေးဖျန်းအကြိမ် - (၃)ကြိမ်

WHO Toxicity Class (II) ☒

အဆိပ်ဖြစ်မှုအဆင့်အတန်း - GHS အုပ်စု (၄)

