

164 mm

164 mm



KEMET 70 WP

ကံမက်

မိုသတ်ဆေး



THIOPHANATE-METHYL 70% w/w WP

Active ingredient:
Thiophanate-methyl:..... 70.0 % w/w
Inert material:..... 30.0 % w/w
Total:..... 100.0 %

250 g



ထုတ်လုပ်သူ

Kenso Corporation (M) Sdn. Bhd.
B-9-3, PJ8 Block B West, No.23 Jalan Barat,
Seksyen 8, 46050 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia

ဖြန့်ချိသူ

Grand Agrocure Co., Ltd.
B-3.562, Third Street, Off Thihathu Road, 11 Ward,
South Okkalapa Township, Yangon, Myanmar.
Tel: 09 31485868, 43009563, 09 795652258

အဆိပ်ဖြစ်မှုအဆင့်အတန်း - GHS အုပ်စု (၅)



သတိ

ကံမက် မိုသတ်ဆေး

KEMET 70 WP

ကလေးများ လက်လှမ်းမမီသောနေရာတွင် သော့ခတ်သိမ်းဆည်းပါ။

သုံးစွဲရန်အညွှန်း

ဤဆေးကို အသုံးမပြုမီ အညွှန်းကို သေချာစွာဖတ်ပါ။

သီးနှံ	ရောဂါ	နှုန်းထား (ဂရမ်/ဧက)	ရိတ်သိမ်းရန် စောင့်ဆိုင်းရမည့်ရက်
ဖရုံ၊ သခွား၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်	ရွက်ပြောက်ရောဂါ	၂၀၀ - ၂၂၅	၁၄
ပဲမျိုးစုံ၊ မြေပဲ	စောပင်နာကျ	၂၂၅ - ၄၅၀	၁၄
ငရုတ်	သီးပုပ်ရောဂါ၊ မွဲပြောက်စွန်းရောဂါ	၄၅၀ - ၆၅၀	၁၄
အာလူး	စောပင်နာကျရောဂါ၊ ပင်ညှိုးရောဂါ	၄၅၀ - ၆၅၀	၁၄

ဤကံမက်ဆေးကို သီးနှံမျိုးစုံတွင် ကျရောက်သောရောဂါများကို ကာကွယ်ရန်နှင့် ကုသရန်အတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်။

အန္တရာယ်ကင်းစွာအသုံးပြုနည်း

အရေးကြီးချက်များကို မှတ်မိစေရန်အတွက် ဂရုပြုပါ။ ဆေးဖျန်းစဉ် ဆေးမှုန်များ မရှူမိအောင်ဂရုပြုပါ။ လက်အိတ်၊ မျက်မှန်၊ နှာခေါင်းစည်းနှင့် ပါးစပ်စည်း၊ အင်္ကျီလက်ရှည်၊ ဘောင်းဘီရှည် စသည့် သင့်လျော်သောအကာအကွယ် ကိရိယာများ ဝတ်ဆင်ပါ။ ဆေးအသုံးပြုစဉ် အစာ မစားရ၊ ဆေးလိပ်မသောက်ရ။ ဆေးအသုံးပြုပြီးပါက မျက်နှာ၊ လက် စသည်တို့ကို ရေ၊ ဆပ်ပြာတို့ဖြင့် စင်ကြယ်အောင်ဆေးကြောပါ။

သိုလှောင်ခြင်းနှင့် စွန့်ပစ်ခြင်း

လေဝင်လေထွက်ကောင်း၍ အေးသောနေရာတွင် မူလဘူးအဖုံးကိုပိတ်ကာ သိမ်းဆည်းပါ။ လုံခြုံစိတ်ချ၍ ကလေးများ လက်လှမ်းမမီ သောနေရာတွင် သိမ်းပါ။ နေရောင်ခြည်အောက်တွင် တာရှည်စွာ မသိမ်းဆည်းရ။ ဘူးခွံကို အန္တရာယ်ကင်းသည့်နေရာတွင် မြေမြှုပ် စွန့်ပစ်ပါ။ ပြန်မသုံးရ။

ရှေးဦးသူနာပြုစုခြင်း

အရေးကြီးနှင့်ထိတွေ့ပါက ရေ၊ ဆပ်ပြာတို့နှင့် ချက်ချင်းဆေးကြောပါ။ မျက်စိထဲဝင်ပါက ရေများများအသုံးပြု၍ (၁၅)မိနစ်ကြာအောင် ချက်ချင်းဆေးကြောပါ။ ရှူမိပါက လူနာကို လေဝင်လေထွက်ကောင်းသောနေရာသို့ရွှေ့ကာ အနားယူပါ။ ဆေးမျိုးချမိပါက လူနာကို ရှေးဦးသူနာပြုစုနည်းအတိုင်း အသက်ရှူအောင်ပြုလုပ်ပါ။ ဆေးမျိုးချမိလျှင် အန်အောင်ပြုလုပ်ပါ။ အရက်၊ အဆီ မတိုက်ကျွေးရ။

Guide for Physician

No specific antidote. Treatment is symptomatic.

စိုက်ခင်းအတွင်း ပြန်လည်ဝင်ရောက်နိုင်သောကာလ - (၁၂)နာရီ

ဆေးဖျန်းခြားရက် - (၇ - ၁၄)ရက်

တစ်ရာသီဆေးဖျန်းအကြိမ် - (၂)ကြိမ်

မိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အမှတ် (Regn. No.) P 2014 - 2101

ထုတ်လုပ်သည့်အမှတ်စဉ် (BN)

ထုတ်လုပ်သည့်နေ့စွဲ (DOM- YYYY/MM/DD)