

140 mm



KEMETA 25 WP

ကံမိတာ

ပင်လုံးပျံ့နှံ့သတ်ဆေး



METALAXYL 25% w/w WP

(ဆေးထုပ်စုံ - Phenylamide)

Active ingredient:

Metalaxyl..... 25.0 % w/w

Inert material..... 75.0 % w/w

Total..... 100.0 %



1 Kg

ထုတ်လုပ်သူ



Kenso Corporation (M) Sdn. Bhd.
B-9-3, P/8 Block B West, No.23 Jalan Barat,
Sekoyen 8, 46050 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia

အသိပေးခြင်းဆိုင်ရာအချက်အလက် - GHS အုပ်စု (၅)

ဖြန့်ချိသူ



Grand Agrocare Co., Ltd.
B-2, 562, Third Street, Off Thihathu Road, 11 Ward,
South Okkalapa Township, Yangon, Myanmar.
Tel: 09 31485868, 43009563, 09 795652258



သတိ



140 mm

ကံမိတာ ပင်လုံးပျံ့နှံ့သတ်ဆေး

KEMETA 25 WP

ကလေးများ လက်လှမ်းမမီသောနေရာတွင် သော့ခတ်သိမ်းဆည်းပါ။

သုံးစွဲရန်အညွှန်း

ဤဆေးကို အသုံးပြုမီ အညွှန်းကို သေချာစာဖတ်ပါ။

သီးနှံ	နှိမ်နင်းနိုင်သောရောဂါများ	ဆေးနှုန်းထား	ရိတ်သိမ်းရန်စောင့်ဆိုင်းရက်
ဓနု၊ သခွားမွှေး၊ သခွား	ရွက်ခြောက်၊ ဖွဲခြောက်စွန်း၊ အော်လီတာနေရီးယား၊ ရွက်ခြောက်၊ ဂမ်ဘီပင်စည်ခြောက်	၂၅၀ - ၈၀၀ / ဧက ၁၀၀ - လီတာ	၁၅
မုန့်ညင်းမုန့်လာ	ရွက်ခြောက်၊ ရွက်ခြောက်၊ ဖွဲခြောက်စွန်း	၂၅၀ - ၈၀၀ / ဧက ၁၀၀ - လီတာ	၁၅
ကြက်သွန်	ရွက်ခြောက်၊ တောက်တိုပြီး	၂၅၀ - ၈၀၀ / ဧက ၁၀၀ - လီတာ	၁၅
အလှစိုက်ပင်များ	ရွက်ခြောက်	၁၅၀ - ၂၅၀ - ၈၀၀ / ဧက ၁၀၀ - လီတာ	၁၅
အာလူး	စောပင်နာကျ၊ နှောင်းပင်နာကျ	၂၅၀ - ၈၀၀ / ဧက ၁၀၀ - လီတာ	၁၅
ဆေးရွက်ကြီး (ပျိုးခင်း)	အပြာရောင်ပျိုး၊ ဖားဖျက်စိ၊ ရွက်ခြောက်	၁၈ - ၈၀၀ / ဧက ၁၅ - လီတာ	၁၅
ဆေးရွက်ကြီး (ရိုက်ကွင်း)	အပြာရောင်ပျိုး	၂၅၀ - ၈၀၀ / ဧက ၁၀၀ - လီတာ	၁၅

အသုံးပြုခြင်း

အရွက်၊ ပင်စည်နှင့် အမြစ်တို့မှ ဖုလ်ယူနိုင်သော ကာကွယ်ခြင်းနှင့် ကုသခြင်းအား နိုင်ငံရှိ ပင်လုံးပျံ့နှံ့သတ်ဆေးဖြစ်သည်။

သတိပြုရန်

မျက်စိ၊ အရေပြားနှင့် မထိစေရ။ ဆေးမှုန့်များ မရှူရှိုက်မိစေပါနှင့်။ ဤဆေးကို ကိုင်တွယ်စဉ် လုံခြုံသော အဝတ်အစား၊ လက်အိတ်၊ မျက်မှန်၊ မျက်နှာဖုံး၊ စင်္ကာ အကာအကွယ်များ ဝတ်ဆင်ပါ။ ဆေးကိုင်တွယ်စဉ် အစာစားသောက်ခြင်း၊ ရေသောက်ခြင်း၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ မြေရေ၊ ဆေးကိုင်တွယ်အသုံးပြုပြီးပါက ဆင်ခြား၊ ရေတံမြင့် သေချာစွာ စင်ကြယ်အောင် ဆေးကြောပါ။

သိုလှောင်ခြင်းနှင့် စွန့်ပစ်ခြင်း

လေဝင်လေထွက်ကောင်း၍ အေးသောနေရာတွင် ဖုလ်အထုပ်အတိုင်း လုံခြုံစွာစိတ်၍ သိမ်းဆည်းပါ။ ကလေးများလက်လှမ်းမမီသောနေရာတွင် သိမ်းဆည်းပါ။ နေရောင်ခြည်အောက်တွင် တာရှည်စွာ မထားရ။ လုံခြုံသောနေရာတွင် ပြေညှိစွာစိတ်၍ သိမ်းဆည်းပါ။ အိတ်ခွံများကို ဖြန့်မသုံးရ။

ရှေးဦးသူနာပြုလုပ်ခြင်း

ဤဆေး အရေပြားနှင့် ထိတွေ့ပါက ရေ၊ ဆပ်ပြာတို့ဖြင့် ရက်ချင်းဆေးကြောပါ။ မျက်စိထိပါက (၁၅) မိနစ်ခန့်ကြာအောင် ရေများဖြင့် ရက်ချင်းဆေးကြောပါ။ ဆေးမျှင်ရူမီပါက ဆေးကုသမှု ရက်ချင်းမယူပါ။ လူနာသတ်ရန်မရှိသော အော့အန်အောင် ပြုလုပ်ပါ။ အသက်ရှူရပ်သွားပါက ရှေးဦးသူနာပြုမှန်ညှိအတိုင်း အသက်ရှူအောင် ပြုလုပ်ပါ။ ဆေးမှုန့်ရူမီပါက အဆိပ်သင့်လူနာကို ဆေးမှုန့်ရှိသောနေရာမှ နေထုတ်ပြီး ဆေးကုသမှု ရက်ချင်းမယူပါစေ။

Guide for Physician

No specific antidote. Treatment is essentially symptomatic.

ရိုက်ခင်းအတွင်း ပြန်လည်ဝင်ရောက်နိုင်သောကာလ - (၂၄) နာရီ

ဆေးမျှင်ကြွေရက် - (၇ - ၁၄) ရက်

တစ်ရာသီဆေးမျှင်အကြိမ် - (၃) ကြိမ်

ရိုးသတ်ဆေးမှတ်တိုင်အမှတ် (Regn. No.) P 2015-2632

ထုတ်လုပ်သည့်အမှတ်စဉ် (BN)

ထုတ်လုပ်သည့်နေ့စွဲ (DOM- YYYY/MM/DD)

CMYK MODE

C 53, Y 100

C 100, M 50

M 25 Y 100 K 25

M 90, Y 100

Y 100

K 100

K 75

120 mm