



KENCOZEB 80 WP

ကံကိုဇက်

မိုသတ်ဆေး



MANCOZEB 80% w/w WP

(ဆေးအုပ်စု - Dithiocarbamate)

Active ingredient:

Mancozeb:..... 80.0 % w/w

Inert material:..... 20.0 % w/w

Total:..... 100.0 %

25 KGS



ထုတ်လုပ်သူ



Kenso Corporation (M) Sdn. Bhd.
B-9-3, PJ8 Block B West, No.23 Jalan Barat,
Seksyen 8, 46050 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia

ဖြန့်ချိသူ



Grand Agrocare Co., Ltd.
B-3.562, Third Street, Off Thihathu Road, 11 Ward,
South Okkalapa Township, Yangon, Myanmar.
Tel: 09 31485868, 43009563, 09 795652258

အဆိပ်ဖြစ်မှုအဆင့်အတန်း - GHS အုပ်စု (၅)



သတိ



ကံကိုဇက် မိုသတ်ဆေး

KENCOZEB 80 WP

ကလေးများလက်လှမ်းမမီသောနေရာတွင် သော့ခတ်သိမ်းဆည်းပါ။

သုံးစွဲရန်အညွှန်း

ဤဆေးကို အသုံးမပြုမီ အညွှန်းကို သေချာစွာဖတ်ပါ။

သီးနှံ	ရောဂါ	နှုန်းထား (ဂရမ်/ဇက)	ရိတ်သိမ်းရန် စောင့်ဆိုင်းရမည့်ရက်
အာလူး၊ ခရမ်းချဉ်	စော/နောင်းပင်နာကျ	၂၀၀ - ၈၀၀	၇
နှံစားသီးနှံများ၊ သခွား၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ ပဲမျိုးစုံ	သံချေး၊ အကြေးဖတ်	၂၀၀ - ၈၀၀	၇
ငှက်ပျော	ဆီဂါတိုကာရောဂါ	၂၀၀ - ၈၀၀	၁၄ - ၂၁
သဘော	သီးပုပ်ရောဂါ	၂၀၀ - ၈၀၀	၁၄ - ၂၁
ဖရုံ၊ သခွားမွေး	ရွက်ပြောက်ရောဂါ၊ အကြေးဖတ်ရောဂါ	၂၀၀ - ၈၀၀	၇ - ၁၀
ငရုတ်	ရွက်ပြောက်ရောဂါ၊ အသီးပုပ်ရောဂါ	၂၀၀ - ၈၀၀	၁၄

ဤကံကိုဇက်ဆေးကို သီးနှံမျိုးစုံတွင် ကျရောက်သော ရောဂါများကို ကာကွယ်ရန်နှင့် ကုသရန်အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ လောင်မဲ
ရောဂါ၊ ရွက်ပြောက်ရောဂါ၊ သံချေးရောဂါ၊ အကြေးဖတ်ရောဂါ၊ ရွက်ပြောက်ရောဂါများကို ကာကွယ်ကုသရုံသာမက သီးနှံစိုက်ခင်းများ၊
သစ်သီးပင်များ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် အလှစိုက်ပင်များတွင် ကျရောက်သော ရှိရောဂါအများစုကို ကာကွယ်ကုသရာတွင် အသုံးပြု
နိုင်သောဆေးဖြစ်ပါသည်။

အန္တရာယ်ကင်းစွာအသုံးပြုနည်း

အရေပြား၊ မျက်စိတို့နှင့် မထိတွေ့အောင် ဂရုပြုပါ။ ဆေးဖျန်းစဉ် ဆေးမှုန်များ မရှူမိအောင်ဂရုပြုပါ။ ဆေးကိုင်တွယ်စဉ် လက်အိတ်၊ မျက်မှန်၊
မျက်နှာဖုံးက တည်ဆဲသင့်လျော်သောကာကွယ်ကိရိယာများ ဝတ်ဆင်ပါ။ ဆေးအသုံးပြုစဉ် အစာမစားရ။ ဆေးလိပ်မသောက်ရ။
ဆေးအသုံးပြုပြီးပါက မျက်နှာ၊ လက် စသည်တို့ကို ရေ၊ ဆပ်ပြာတို့ဖြင့် စင်ကြယ်အောင်ဆေးကြောပါ။

သိုလှောင်ခြင်းနှင့် စွန့်ပစ်ခြင်း

လေဝင်လေထွက်ကောင်း၍ အေးသောနေရာတွင် မူလဘူးအဖုံးကိုပိတ်ကာ သိမ်းဆည်းပါ။ လုံခြုံစိတ်ချ၍ ကလေးများ လက်လှမ်းမမီ
သောနေရာတွင် သိမ်းပါ။ နေရောင်ခြည်အောက်တွင် တာရှည်စွာ မသိမ်းဆည်းရ။ ဘူးခွံကို အန္တရာယ်ကင်းသည့်နေရာတွင် မြေမြှုပ်စွန့်
ပစ်ပါ။ ပြန်မသုံးရ။

ရှေးဦးသူနာပြုခြင်း

အရေပြားနှင့်ထိတွေ့ပါက ရေ၊ ဆပ်ပြာတို့နှင့် ချက်ချင်းဆေးကြောပါ။ မျက်စိထဲဝင်ပါက ရေများများအသုံးပြု၍ (၁၅)မိနစ်ကြာအောင်
ချက်ချင်းဆေးကြောပါ။ ဆေးမျိုးချစ်ပါက လူနာကို ရေ (၁ - ၂) ဖန်ခွက်ခန့် တိုက်၍ ရှေးဦးသူနာပြုစနည်းအတိုင်းအော့အန်အောင်ပြုလုပ်
ပေးပါ။ ဆေးအညွှန်းစာနှင့်အတူ ဆရာဝန်ထံ ချက်ချင်း ကုသမှုခံယူပါ။

Notes to Physician

If swallowed, induced vomiting by administering syrup of IPECAC. Symptomatic treatment should follow.

စိုက်ခင်းအတွင်း ပြန်လည်ဝင်ရောက်နိုင်သောကာလ - (၂၄)နာရီ

ဆေးဖျန်းခြားရက် - (၇ - ၁၀)ရက်

တစ်ရာသီဆေးဖျန်းအကြိမ် - (၃)ကြိမ်

မိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အမှတ် (Regn. No.) P 2014 - 2100

ထုတ်လုပ်သည့်အမှတ်စဉ် (BN)

ထုတ်လုပ်သည့်နေ့စွဲ (DOM- yyyy/mm/dd)

W: 297x H: 210 mm

CMYK MODE

C 53, Y 100

C 100, M 50

M 25 Y 100 K 25

M 90, Y 100

Y 100

K 100

K 75