

ကလေးများလက်လှမ်းမမီသောနေရာတွင် သော့ခတ်သိမ်းဆည်းပါ။

သတိပြုရန်

ဆေးဖျန်းထားသောနေရာသို့ ဆေးဖျန်းပြီးနောက် အနည်းဆုံး (၁၄)ရက် ကြာမှ ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်နိုင်သည်။ မျက်စိ အရေပြားနှင့် အဝတ်အစား၊ တို့အား ဆေးမထိစေရန် ဂရုပြု ကိုင်တွယ်အသုံးပြုပါ။

အန္တရာယ်ကင်းစွာအသုံးပြုနည်း

ဆေးဖျန်းစဉ် ဆေးမှုန်များ မရှူမိအောင်ဂရုပြုပါ။ ဆေးကိုင်တွယ်စဉ် လက်အိတ်၊ မျက်မှန်၊ မျက်နှာဖုံးကာ စသည့် သင့်လျော်သောအကာအကွယ်ကိရိယာများ ဝတ်ဆင်ပါ။ ဆေး အသုံးပြုစဉ် အစာမစားရ၊ ဆေးလိပ်မသောက်ရ။ ဆေးကိုင်တွယ်အသုံးပြုပြီးပါက မျက်နှာ၊ လက် စသည်တို့ကို ရေ၊ ဆပ်ပြာတို့ဖြင့် စင်ကြယ်အောင် သေချာစွာဆေးကြောပါ။

သိုလှောင်ခြင်းနှင့် စွန့်ပစ်ခြင်း

ဘူးခွံကို ရေနှင့် အစားအစာ မထည့်ရ။ ဖျက်ဆီးပြီး မြေမြှုပ်ပစ်ပါ။ ကလေးများ၊ အစားသောက် များနှင့်ဝေးပြီး အေး၍ နေရောင်တိုက်ရိုက်မထိသည့်နေရာတွင် သော့ခတ်သိမ်းဆည်းပါ။

ရှေးဦးသူနာပြုစုခြင်း

ဆေးမျှမိလျှင် ချက်ချင်းအန်အောင်ပြုလုပ်၍ ဆရာဝန်ထံ ပြသပါ။ မျက်စိထဲဝင်လျှင် ချက်ချင်း ရေများများနှင့် ဆေးကြော၍ ဆရာဝန်ထံ ပြသပါ။ အရေပြားကို ဆေးထိလျှင် အဝတ်အစား ကို ချွတ်ပစ်၍ ဆပ်ပြာနှင့် ရေများများသုံးကာ သန့်စင်အောင် ဆေးကြောပါ။ ရှူမိလျှင် လူနာကို လေသန့်ရနိုင်သည့်နေရာသို့ ရွှေ့ထားပြီး ဆေးကုသမှု ခံယူပါ။

Notes to Physician

No specific antidote due to its low toxicity. Treatment is symptomatic.



KEN-UP

ကင်အပ်

အစွမ်းထက်ရွှေ့ချယ်မှု ဂလိုဖိုဆိုတ်ပေါင်းသတ်ဆေး



GLYPHOSATE 41% w/w SL (ဆေးအုပ်စု - Glycine)

Active ingredient: Glyphosate(Isopropylammonium Salt) ... 41 % W/W
Inert material: 59 % W/W
Total: 100 %

1 Litre

ထုတ်လုပ်သူ

Kenso Corporation (M) Sdn. Bhd.
B-9-3, PJ8 Block B West, No.23 Jalan Barat,
Seksyen 8, 46050 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
WHO CLASS (U)

ဖြန့်ချိသူ

Grand Agrocare Co., Ltd.
B-3.562, Third Street, Off Thihathu Road, 11 Ward,
South Okkalapa Township, Yangon, Myanmar.
Tel: 09 31485868, 43009563, 09 795652258
အဆိပ်ပြစ်မှုဆိုင်အတန်း - GHS အုပ်စု (၅)



သတိ



ကင်အပ်

အစွမ်းထက်ရွှေ့ချယ်မှု ဂလိုဖိုဆိုတ်ပေါင်းသတ်ဆေး

KEN-UP

သုံးစွဲရန်အညွှန်း

နှိမ်နှင်းနိုင်သောပေါင်းများ	ဆေးနှုန်းထား (စီစီ/ဧက)	ကြီးထွားမှု အဆင့်	မှတ်ချက်
လယ်မြေ - မေါင်းပေါင်း၊ လက်သဲရွာ၊ မြက်ကွမ်းသီးကြီး၊ သမန်မြက်၊ ဝါးရံမြက်၊ ရှင်နွယ်လုံး၊ ဝက်လှာ - တုတ်တောင်၊ ကျွဲနွားခေါင်း၊ ရေဆလင်း၊ ရေကညွတ်၊ လယ်လေညောင်း၊ မိုးနတ်၊ ကတောက်ဆတ်၊ လယ်ယာ	၄၇၅-၉၅၀ ၇၁၀-၉၅၀	၃-၈ လက်မ ၆-၁၂ လက်မ	တောရိုင်းမြေများ၊ စားကျက်မြက်ပေါင်းများနှင့် ပြောင်း၊ ကြီးဝါးစေ့ဘာ၊ ဆီအုန်းရိုက်ကွင်းများတွင် တစ်နှစ်နှင့် နှစ်ရံညီမြက်များ၊ ရွက်ပြွန်ပေါင်းများ နှိမ်နှင်းရာ၌ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဆေးနှင့်ထိတွေ့သည့် အပင်များအားလုံးကို ၁၁၁၈၈ နိုင်ငံသားအာနိသင်ရှိသဖြင့် နိုက်ခင်း၊ နိုက်ကွင်းများတွင် လက်ဖျန်းအသုံးပြုပါက သီးနှံပင်များ၊ အပင်ကြီးများနှင့် မထိအောင် ဂရုစိုက်ပတ်သတ်မှုများအသုံးပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။ ပေါင်းသတ်ဆေးဖျန်းပြီးနောက် ထိရောက်မှုအားကောင်းစေရန် တစ်နှစ်ပေါင်းမြက်များတွင် - (၁)ရက် နှစ်ရံညီပေါင်းမြက်များတွင် - (၇)ရက်အတွင်း ထွန်းယက်ရိုက်ချိတ်ခြင်း၊ ကျွဲနွားလွတ်ကောင်ခြင်း မပြုလုပ်သင့်ပါ။
ယာမြေ - ဝါရိုင်း၊ ကပ်စေးနီ၊ ဘီစီ၊ ရှမ်းမြေ၊ တောကြက်မောက်လေး၊ ပင်စိမ်းရိုင်း၊ ကြိတ်မှန်၊ လိပ်ရင်ဘတ်၊ ဘီကရုံ၊ စာကလေးစီး၊ ပင့်ကူထိပ်ပိတ် - လေးရွာ၊ ပန်းတော်၊ ပန်းတော်ညို၊ လက်သဲရွာ၊ ဝမ်းသဲစာ၊ ဆင်ရံမြက်၊ သက်ကယ်၊ မြက်ယာ၊ မြက်ကြိတ်၊ ကိုင်မြက်	၁၂၀၀-၁၅၀၀ ၉၅၀-၁၂၀၀	၆-၈ လက်မ ၃-၆ လက်မ	သစ်သီးမြေ၊ စေ့ဘာ၊ ဆီအုန်း စသည့် နှစ်ရံညီပေါင်းများ - ထိကရုံ၊ တံမြက်ညှပ်ပင်၊ ကျွဲကောင်၊ မင်ဆေး၊ ပင်စိမ်းရိုင်း၊ ဟင်းနုနွယ် ဆူးပေါက်၊ ကပ်စေးနီ၊ လေးရွာမြက်၊ လက်သဲရွာမြက်၊ ကြိုးကြွေးမြက်၊ မြက်ပန်း၊ မြက်ခါး
	၁၂၀၀-၁၅၀၀	၆-၁၂ လက်မ	ပိုးမခါးခြင်း၊ ရေလှောင်ခြင်း၊ ရာသီဥတုနှင့်ပိုမို မြင့်သန့်စွာကွာရှောင်သောအခြေအနေတွင် ဆေးဖျန်းသင့်ပါ။

ဆေးဖျန်းပြီးနောက် သီးနှံရိုက်သိမ်းရန်စောင့်ဆိုင်းရမည့်ရက် (၁၄)ရက်

ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အမှတ် (Regn. No.) F 2014 -370

ထုတ်လုပ်သည့်အမှတ်စဉ် (BN) 001

ထုတ်လုပ်သည့်နေ့စွဲ (DOM- YYYY/MM/DD) 2016/11/13

သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်နေ့စွဲ (Expired Date- YYYY/MM/DD) 2018/11/13

(ပြန်ကြည့်ပါ)
ဦးစီးအရာရှိ
တိရစ္ဆာန်နှင့် သစ်တောရေးရာဌာန