



တွဲဆက်လက်ကမ်း အထူးလျှောက်လှမ်း:

GOLDEN OWLS

ကံဆိပ်ကံ

ထိသေစားသေ
ပင်လုံးပျံ့ပွားသတ်ဆေး



KENCEPAT 75 SP
CONTACT & STOMACH
SYSTEMIC INSECTICIDE

ACEPHATE 75 w/w SP
Active ingredient:
Acephate:..... 75.0 %
Inert material:..... 25.0 %
Total:..... 100.0 %

မလေးရှား၊ ဩစတြေးလျ၊ ယိုးဒယား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ပီယက်နမ်နှင့် နိုင်ငံများတွင် စိုက်ပျိုးရေးသုံးဆေးများဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် ဆက်စပ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ အောင်မြင်စွာလုပ်ကိုင်ပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း အလားတူ စိုက်ပျိုးရေးသုံးဆေးများ၊ မြေဩဇာများ၊ ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာများ ဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရန် Golden Owls အမှတ်တံဆိပ် Kenso စိုက်ပျိုးရေးသုံးဆေးများကို မိတ်ဆက်ဖြန့်ချိလိုက်ပါပြီ။

ထုတ်လုပ်သူ

Kenso Corporation (M) Sdn. Bhd.
B-9-3, PJ8 Block B West, No.23 Jalan Barat,
Seksyen 8, 46050 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia

ဖြန့်ချိသူ

GRAND AGRO CARE Co., Ltd.
No.93, Thuya Road, 9th Ward, South Okkalapa Township, Yangon, Myanmar.
Tel: 01-570096, 09 31485868, 09 250 691007

ISO9001:2008 Certified Company



ကံဆိပ်ကံ ၇၅ အက်စ်ပီ


ထိသေစားသေပင်လုံးပျံ့ပွားသတ်ဆေး

KENCEPAT 75 SP

CONTACT & STOMACH
SYSTEMIC INSECTICIDE

- အော်ဂယ်နိုဗော့စိတ်ဓာတ်ပေါင်းအုပ်စုဝင် ပိုးသတ်ဆေးဖြစ်သည်။
- ထိသေစားသေနှင့် ပင်လုံးပျံ့အာနိသင်ရှိသည်။
- စွဲကပ်ပျံ့နှံ့မှု ကောင်းမွန်သဖြင့် အပင်တွင် ဆေးအာနိသင်တာရှည်စွဲမြဲစေသည်။
- သီးနှံပင်ကို လောင်ကျွမ်းမှု (လုံးဝ)မဖြစ်ပေါ်စေပါ။
- အခြားပိုးသတ်ဆေးများနှင့် ရောစပ်အသုံးပြုနိုင်သည်။

ဖြတ်ပိုးများ



အသုံးပြုရန်အညွှန်း

သီးနှံ	နှိမ်နင်းနိုင်သောဖျက်ပိုးများ	ဆေးနှုန်းထား(ဂရမ်/ဧက)	ရိတ်သိမ်းရန် စောင့်ဆိုင်းရက်
ပဲမျိုးစုံ	- လှေးပိုး - ပျို သရစ်ပိုး၊ ယင်ဖြူ၊ ပင်ဖြတ်ပိုး၊ ပဲကျိုင်း၊ စုပ်ပိုး၊ ထွာကောင် - ငမြောင်တောင်	၃၀၀ - ၄၀၀ ၃၀၀ - ၆၀၀ ၄၅၀ - ၆၀၀	၁၄
ဝါ	- ပျို သရစ်ပိုး၊ လှေးပိုး၊ ယင်ဖြူ၊ ငမြောင်တောင်၊ သီးလုံးဖောက်ပိုး၊ ပျိုပိုးစိမ်း	၄၀၀ - ၆၀၀	၂၀
မြေပဲ	- နံ့ကောင်၊ သရစ်ပိုး၊ ဖြတ်ပိုးအမျိုးမျိုး၊ ထွာကောင်၊ ငမြောင်တောင်	၄၅၀ - ၆၀၀	၁၄
ဂေါ်ဖီ၊ ပန်းမုန်လာ	- ဂေါ်ဖီထွာကောင်၊ စိန်ကွက်ဖလံ၊ ပျို	၄၅၀ - ၆၀၀	၁၄
အာလူး	- ပျို အာလူးဥထိုးဖလံ	၃၀၀ - ၆၀၀	၁၄
ခရမ်းချဉ်	- အမေရိကန်သီးလုံးဖောက်ပိုး၊ သရစ်ပိုး	၁၀၀ - ၁၅၀ ဂရမ်/ ရေ ၁၀၀ လီတာ	၁၄

စိုက်ခင်းအတွင်း ပြန်လည်ဝင်ရောက်နိုင်သောကာလ - (၁၂ - ၂၄) နာရီ
ဆေးဖျန်းခြားရက် - (၇ - ၁၄) ရက်
တစ်ရာသီဆေးဖျန်းအကြိမ် - (၂) ကြိမ်

WHO Toxicity Class (II)

အဆိပ်ဖြစ်မှုအဆင့်အတန်း - GHS အုပ်စု (၄)



သတိ