

ကလေးများလက်လှမ်းမမီသောနေရာတွင် သော့ခတ်သိမ်းဆည်းပါ။

အသုံးပြုခြင်း

ဤဆေးသည် သီးနှံပင်များတွင် ကျရောက်သော မှိုရောဂါအမျိုးမျိုးကို ထိသေအာနိသင်အစွမ်းဖြင့် ကာကွယ်နိုင်ပေးနိုင်သည်။ မှိုရောဂါများမျိုးပွားရင်သန့်ကြီးထွားမှုအတွက် အရေးပါသော အင်ဇိုင်းများဖြစ်ပေါ်မှုကို တားဆီးခြင်းအားဖြင့် ရောဂါများကို ကာကွယ်နိုင်ပေးမည်။

သတိပြုရန်

မျက်စိ၊ အရေပြားတို့နှင့် မထိစေရ။ ဆေးမှုန့်များ မရှူရှိုက်မိစေပါနှင့်။ ဤဆေးကိုကိုင်တွယ်စဉ် လုံခြုံသောအဝတ်အစား၊ လက်အိတ်၊ မျက်မှန်၊ နှာခေါင်းစည်း အကာအကွယ်များ ဝတ်ဆင်ပါ။ ဆေးကိုင်တွယ်စဉ် အစာစားသောက်ခြင်း၊ ရေသောက်ခြင်း၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း မပြုရ။ ဆေးကိုင်တွယ်အသုံးပြုပြီးပါက ဆပ်ပြာ၊ ရေ တို့ဖြင့်သေချာစွာ စင်ကြယ်အောင် ဆေးပါ။

သိုလှောင်ခြင်းနှင့် စွန့်ပစ်ခြင်း

လေဝင်လေထွက်ကောင်း၍ အေးသောနေရာတွင် မူလအထုပ်အတိုင်း လုံခြုံစွာပိတ်၍ သိမ်းဆည်းပါ။ ကလေးများလက်လှမ်းမမီသောနေရာတွင် သိမ်းဆည်းပါ။ နေရောင်ခြည်အောက်တွင် တာရှည်စွာမထားရ။ လုံခြုံသောနေရာတွင် မြေမြှုပ်စွန့်ပစ်ပါ။ အိတ်ခွံများကို ပြန်မသုံးရ။

ရှေးဦးသူနာပြုစုခြင်း

ဤဆေး အရေပြားနှင့် ထိတွေ့ပါက ရေ၊ ဆပ်ပြာတို့ဖြင့် ချက်ချင်းဆေးကြောပါ။ မျက်စိထဲဝင်ပါက (၁၅)မိနစ်ခန့်ကြာအောင် ရေများဖြင့် ချက်ချင်းဆေးကြောပါ။ ဆေးမျိုချမိပါက ဆေးကုသမှု ချက်ချင်းခံယူပါ။ အဆိပ်သင့်လူနာ သတိရနေပါက အော့အန်အောင် ပြုလုပ်ပါ။ အသက်ရှူရပ်သွားပါက ရှေးဦးသူနာပြုစုနည်းအတိုင်း အသက်ရှူအောင်ပြုလုပ်ပါ။ ဆေးမှုန့်ရှူရှိုက်မိပါက အဆိပ်သင့်လူနာကို လေကောင်းလေသန့်ရသောနေရာသို့ရှေ့ပြီး ဆေးကုသမှု ချက်ချင်းခံယူပါ။

Guide for Physician

No specific antidote. Treatment is essentially symptomatic.



GOLDEN OWLS

KENCONIL 500 SC

ကံကိုနေးလ်

ထိသေမှုသတ်ဆေး



CHLOROTHALONIL 50% w/v SC
(ဆေးအုပ်စု - chloronitrile)

Active ingredient: Chlorothalonil..... 50.0 %
Inert material:..... 50.0 %
Total:.....100.0 %

500 cc

ထုတ်လုပ်သူ

Kenso Corporation (M) Sdn, Bhd.
B-9-3, PJB Block B West, No.23 Jalan Barat, Seksyen 8,
46050 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Kenso

ဖြန့်ချိသူ

GRAND AGRO CARE Co., Ltd.
B-3.562, Third Street, Off Thihathu Road, 11 Ward,
South Okkalapa Township, Yangon, Myanmar.
Tel:09 31485868, 43009563, 09 795652258

အဆိပ်မြှုပ်မှုအဆင့်အတန်း - GHS အုပ်စု (၅)



သတိ

ကံကိုနေးလ်

ထိသေမှုသတ်ဆေး

KENCONIL 500 SC

ဤဆေးကို အသုံးပြုမီ အညွှန်းကို သေချာစွာဖတ်ပါ။

သုံးစွဲရန်အညွှန်း

သီးနှံ	နှိုင်းနှင်းနိုင်သောရောဂါများ	ဆေးနှုန်းထား (စီစီ/ဧက)	ရိုက်သိမ်းရန် စောင့်ဆိုင်းရက်
ပဲအမျိုးမျိုး၊ ဂေါ်ဖီထုပ်၊ ဘရိုက်လီ၊ ပန်းဂေါ်ဖီ	ရွက်ခြောက်၊ သံချေး၊ ရွက်ပြောက်	၁၀၀၀ - ၁၅၀၀ ၁၀၀၀ - ၁၅၀၀	၇ - ၁၄ ၇ - ၁၄
ဖရုံ၊ သခွား၊ သခွားမွှေး	မှိုပြောက်စွန်း၊ ရွက်ခြောက်၊ ဂမ်မီအစေးထွက်၊ နှောင်းပင်နာကျ၊ ရွက်ပြောက်၊ ဗားဥဂို	၁၀၀၀ - ၁၅၀၀	၇ - ၁၄
ကြက်သွန်	ရွက်ခြောက်	၁၃၀၀	၇ - ၁၄
မြေပဲ	စောရွက်ပြောက်၊ နှောင်းရွက်ပြောက်၊ ပင့်ကူအိမ်အနာကွက်၊ သံချေး	၆၅၀ - ၁၀၀၀	၇ - ၁၄
အာလူး	စောပင်နာကျ၊ နှောင်းပင်နာကျ	၆၅၀ - ၁၀၀၀	၇ - ၁၄
စပျစ်	ရွက်ခြောက်၊ ရွက်နက်ပြောက်	၆၅၀ - ၁၀၀၀	၇ - ၁၄

- ဆေးဖျန်းပြီး ပြန်လည်ဝင်ရောက်နိုင်သောကာလ - (၁၂)နာရီ
- ဆေးဖျန်းခြားရက် - (၇ - ၁၄) ရက်
- တစ်ရာသီဆေးဖျန်းအကြိမ်ရေ - (၃)ကြိမ်

ဝိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အမှတ် (Regn. No.) P 2015 - 2629

ထုတ်လုပ်သည့်အမှတ်စဉ် (BN)

ထုတ်လုပ်သည့်နေ့စွဲ (DOM- YYYY/MM/DD)