

ကလေးများလက်လှမ်းမမီသောနေရာတွင် သော့ခတ်သိမ်းဆည်းပါ။

အသုံးပြုခြင်း

ဤဆေးသည် ကာကွယ်ခြင်းနှင့် ကုသခြင်းအာနိသင်ရှိသော ပင်လုံးပျံ့ပွားသော ဖြစ်သည်။ ရောဂါဖြစ်စေသော မှို၏ ဆဲလ်နံရံအပေးပေးမှုများ တည်ဆောက်ခြင်းကို တားဆီးပေးခြင်းဖြင့် ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။

သတိပြုရန်

- မျက်စိ၊ အရေပြားတို့နှင့် မထိစေရ။ ဆေးမှုန့်များ မရှူရှိုက်မိစေပါနှင့်။ ဤဆေးကို ကိုင်တွယ်စဉ် လုံခြုံသော အဝတ်အစား၊ လက်အိတ်၊ မျက်မှန်၊ နှာခေါင်းစည်း အကာအကွယ်များ ဝတ်ဆင်ပါ။ ဆေးကိုင်တွယ်စဉ် အစာစားသောက်ခြင်း၊ ရေသောက်ခြင်း၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း မပြုရ။ ဆေးကိုင်တွယ်အသုံးပြုပြီးပါက ဆပ်ပြာ၊ ရေတို့ဖြင့် သေချာစွာ စင်ကြယ်အောင် ဆေးပါ။

သိုလှောင်ခြင်းနှင့် စွန့်ပစ်ခြင်း

လေဝင်လေထွက်ကောင်း၍ အေးသောနေရာတွင် မူလဘူးအတိုင်း လုံခြုံစွာပိတ်၍ သိမ်းဆည်းပါ။ ကလေးများ လက်လှမ်းမမီသောနေရာတွင် သိမ်းဆည်းပါ။ နေရောင်ခြည်အောက်တွင် တာရှည်စွာမထားရ။ လုံခြုံသောနေရာတွင် မြေမြှုပ်စွန့်ပစ်ပါ။ အိတ်ခွံများကို ပြန်မသုံးရ။

ရှေးဦးသူနာပြုရခြင်း

ဤဆေး အရေပြားနှင့် ထိတွေ့ပါက ရေ၊ ဆပ်ပြာတို့ဖြင့် ချက်ချင်းဆေးကြောပါ။ မျက်စိထဲဝင်ပါက (၁၅)မိနစ်ခန့်ကြာအောင် ရေများဖြင့် ချက်ချင်းဆေးကြောပါ။ ဆေးမျှံချိတ်ပါက ဆေးကုသမှု ချက်ချင်းခံယူပါ။ အဆိပ်သင့်လူနာ သတိရနေပါက အော့အန်အောင် ပြုလုပ်ပါ။ အသက်ရှူရပ်သွားပါက ရှေးဦးသူနာပြုနည်းအတိုင်း အသက်ရှူအောင် ပြုလုပ်ပါ။ ဆေးမှုန့်ရှူရှိုက်မိပါက အဆိပ်သင့်လူနာကို လေကောင်းလေသန့်ရသောနေရာသို့ ရွှေ့ပြီး ဆေးကုသမှု ချက်ချင်းခံယူပါ။

Guide for Physician

No specific antidote. Treatment is essentially symptomatic.



KENDIZOL 250 EC

ကံဒီဇိုလ်

ပင်လုံးပျံ့ပွားသော



DIFENOCONAZOLE 25% w/v EC

(ဆေးအုပ်စု - Triazoles)

Active ingredient:

Difenoconazole:..... 25.0 %

Inert material:..... 75.0 %

Total:..... 100.0 %

250 cc

ထုတ်လုပ်သူ

Kenso Corporation (M) Sdn. Bhd.,
B-9-3, P/8 Block B West, No.23 Jalan Barat, Seksyen 8,
Kenso 46050 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

မြို့နယ်

GRAND AGRO CARE Co., Ltd.,
B-3,562, Third Street, Off Thihathu Road, 11 Ward,
South Okkalapa Township, Yangon, Myanmar.
Tel: 09 31485868, 43009563, 09 7956652258

သတိပြုရန်အသင့်အသင့် - GHS အုပ်စု (၅)



ကံဒီဇိုလ် ပင်လုံးပျံ့ပွားသော

KENDIZOL 250 EC

သုံးစွဲရန်အညွှန်း

ဤဆေးကို အသုံးမပြုမီ အညွှန်းကို သေချာစွာဖတ်ပါ။

သီးနှံ	နှိမ်နင်းနိုင်သောမှိုရောဂါများ	ဆေးနှုန်းထား (စီစီ/ဧက)	ရိတ်သိမ်းရန် စောင့်ဆိုင်းရက်
မြေပဲ	စောရွက်ပြောက် နှောင်းရွက်ပြောက် ပင်းကူအိမ်အနာကွက် သံချေး	၁၅၀ ၈၀ ၁၃၅ ၁၅၀	၂၁
အစေ့ထုတ်ပြောင်း ဖူးစားပြောင်း	မီးမီးရောင်ရွက်ပြောက် ရွက်ခြောက်	၁၂၅	၁၄
အာလူး	စောပင်နာကျ	၁၄၀	၇
ခရမ်းချဉ်	ပင်ညှိုး	၁၂၅	၃

ဆေးဖျန်းပြီး ပြန်လည်ဝင်ရောက်နိုင်သောကာလ - (၁၂)နာရီ

ဆေးဖျန်းခြားရက် - (၁၀ - ၂၁) ရက်

တစ်ရာသီဆေးဖျန်းအကြိမ်ရေ - (၃)ကြိမ်

မိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အမှတ် (Regn. No.) P 2015-2631

ထုတ်လုပ်သည့်အမှတ်စဉ် (BN)

ထုတ်လုပ်သည့်နေ့စွဲ (DOM- YYYY/MM/DD)

W:205 x H:59 mm

CMYK MODE

C 53, Y 100

C 100, M 50

M 25 Y 100 K 25

M 90, Y 100

Y 100

K 100

K 75