

ကလေးများလက်လှမ်းမမီသောနေရာတွင် သော့ခတ်သိမ်းဆည်းပါ။

အသုံးပြုခြင်း

ဤဆေးသည် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းနှင့် အစာအိမ်အဆိပ်သင့်အာနိသင်ရှိပြီး ခရုသတ်ဆေးအဖြစ် ထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်။

သတိပြုရန်

- မျက်စိ၊ အရေပြားတို့နှင့် ဖတ်စေရ။ ဆေးမှုန့်များ မရရှိနိုင်ပါ။ ဤဆေးကို ကိုင်တွယ်စဉ် လုံခြုံသော အဝတ်အစား၊ လက်အိတ်၊ မျက်မှန်၊ မျက်နှာဖုံး စသော အကာအကွယ်များ တပ်ဆင်ပါ။ ဆေးကိုင်တွယ်စဉ် အစာစားသောက်ခြင်း၊ ရေသောက်ခြင်း၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း မပြုရ။ ဆေးကိုင်တွယ်အသုံးပြုပြီးပါက ဆပ်ပြာ၊ ရေတို့ဖြင့် သေချာစွာ စင်ရှင်းအောင် ဆေးပါ။

သိုလှောင်ခြင်းနှင့် စွန့်ပစ်ခြင်း

လေဝင်လေထွက်ကောင်း၍ အေးသောနေရာတွင် မူလအထုပ်အတိုင်း လုံခြုံစွာပိတ်၍ သိမ်းဆည်းပါ။ ကလေးများလက်လှမ်းမမီသောနေရာတွင် သိမ်းဆည်းပါ။ နေရောင်ခြည် အောက်တွင် တာရှည်စွာမထားရ။ လုံခြုံသောနေရာတွင် မြေမြှုပ်စွန့်ပစ်ပါ။ အိတ်ခွံများကို ပြန်မသုံးရ။

ရှေးဦးသူနာပြုစုခြင်း

ဤဆေး အရေပြားနှင့်ထိတွေ့ပါက ရေ၊ ဆပ်ပြာတို့ဖြင့် ချက်ချင်းဆေးကြောပါ။ ဗျက်စိထိ ဝင်ပါက (၁၅) မိနစ်ခန့်ကြာအောင် ရေများများဖြင့် ချက်ချင်းဆေးကြောပါ။ ဆေးမျှခွံမိပါက ဆေးကုသမှု ချက်ချင်းခံယူပါ။ အဆိပ်သင့်လူနာ သတိရနေပါက အော့အန်အောင် ပြုလုပ်ပါ။ အသက်ရှူရပ်သွားပါက ရှေးဦးသူနာပြုစုနည်းအတိုင်း အသက်ရှူအောင် ပြုလုပ်ပါ။ ဆေးမုန်ရှူရှိုက်မိပါက အဆိပ်သင့်လူနာကို လေကောင်းလေသန့်ရသောနေရာ သို့ရွှေ့ပြီး ဆေးကုသမှု ချက်ချင်းခံယူပါ။

Guide for Physician

No specific antidote. Treatment is essentially symptomatic.



KENSAMIDE 250 EC

ကံဆမိုက်

အဆိပ်ငွေ့နှင့် အစာအိမ်အဆိပ်သင့် ခရုသတ်ဆေး

NICLOSAMIDE 25% w/v EC

Active ingredient:	
Nicosamide:	25.0 %
Inert material:.....	75.0 %
Total:.....	100.0 %
(600300 - salicylanilides)	

(ဆေးအုပ်စု - salicylanilides)

ထုတ်လုပ်သူ

Kenso Corporation (M) Sdn. Bhd.
B-9-3, PJ8 Block B West, No.23 Jalan Barat, Seksyen 8,
46050 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

ဖြန့်ချိသူ

 **GRAND AGROCARE Co., Ltd.**
No.205, Thihathu Street, 11th Ward, South Okkalapa
Township, Yangon, Myanmar.
Tel: 09 31485868, 09 43009563, 09 795652258

အဆိပ်ဖြစ်မှုအဆင့်အတန်း - GHS အုပ်စု (၄)

WHO Toxicity Class (U)



Caution



ကံဆပျက်

အဆိပ်ငွေ့နှင့် အစာအိမ်အဆိပ်သင့် ခရုသတ်ဆေး

KENSAMIDE 250 EC

ဤဆေးကို အသုံးမပြုမီ အညွှန်းကို သေချာစွာဖတ်ပါ။

သုံးစွဲရန်အညွှန်း

သီးနှံ	နှိပ်နင်းနိုင်သောဖျက်ပိုးများ	ဆေးနှုန်းထား (စီစီ/ဧက)	မှတ်ချက်
စပါး	ခရု	၄၀၀	ထိရောက်မှုရှိစေရန် ဆေးဖျန်းစဉ်နှင့် ဆေးဖျန်းပြီးနောက် စပါးခင်းထဲတွင် ရေအမြင့် ၁ - လက်မဝန်းကျင် ရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။

ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အမှတ် (Regn. No.) 2015-2630

ထုတ်လုပ်သည့်အမှတ်စဉ် (BN)

ထုတ်လုပ်သည့်နေ့စွဲ (DOM- YYYY/MM/DD)